Les particularités de certains races félines

Le Sphynx

La particularité de ce chat est issue d'une mutation génétique qui fait que les chats nus ont une déperdition calorique de par leur absence de poils.
Il semblerait que les sphynx aient un déficit de thermorégulation, bien que certains éleveurs indiquent que leurs chats tolèrent bien le froid. Toutefois si les chats ne vivent pas en extérieur durant les mois d'hiver, il n'est pas nécessaire d'augmenter la quantité des prises quotidienne, et certainement pas les doubler, ce qui entrainerait un surpoids et les conséquences qui en découlent. En effet, en m'aventurant sur certains forums, blogs et sites qui mettent avant l'alimentation crue, j'ai surprise de voir la médiocrité de la composition des gamelles. La plupart du temps des broyés de poulet avec un peu de bœuf haché. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines recommandations de quantités journalières indiquent jusqu'à 6 % du poids du chat.
En outre, ce sont des chats, qui comme d'autres races, sont prédisposés génétiquement à la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) et le surpoids est un facteur aggravant de troubles cardiovasculaires. Il est donc important de veiller à nourrir son animal avec une alimentation biologiquement adaptée à ses besoins et en quantités appropriées.

Démarrez comme pour n'importe quel chat en suivant notre calculateur et pesez le après 3 semaines. Ici, en terme d'alimentation, nous considérons les chats comme adultes dès 12 mois.
Une petite perte de poids peut survenir, due au changement alimentaire, ne vous inquiétez pas. Toutefois, si la perte de poids se poursuit ou est trop importante, augmentez les quantités de 10 % et pesez votre chat à nouveau 3 semaines plus tard. Fiez vous à sa ligne également et à vos sensations



Maine coon et chats norvégiens

Comme leur nom l'indique l'un est issu de l'Etat du Maine aux Etats Unis et l'autre des forets d'Europe du Nord. Ces chats font partie des races « géantes » et leur grande taille est souvent accompagné de surpoids. En effet trop nombreux sont ceux qui confondent croissance, c'est à dire prise de taille et de poids, et engraissement, en prenant pour référence les standards de la race et en argumentant que la croissance de ces chats est longue (plus de 3 ans). On peut d'ailleurs lire sur le site Maine Coon Central « le rythme de croissance lent des chats de la race Maine Coon signifie que ces grands chats continuent à grandir jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans ». Donc on parle bien de taille. Or même en étant des races plus imposantes que les autres, les Maine coon notamment ne sont pas des poneys et n'ont pas une croissance équivalente à la gestation d'un requin-lézard. Pour étayer mon propos, j'ai tenté de trouver des études sur la croissance de ces

grands chats et bien que je ne remette pas en question les observations des éleveurs, mes recherches sont restées infructueuses quant aux particularités qui feraient que ces chats aient une croissance si longue. Toutes les courbes de croissance que j'ai pu trouver sur le net tant concernant la taille, s'arrêtent entre 12 et 15 mois.

En outre, ce sont des chats, qui comme d'autres races, sont prédisposés génétiquement à la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) ainsi qu'à la dysplasie des hanches et le surpoids est un facteur aggravant de troubles cardiovasculaires et de problèmes articulaires lors de la croissance. Il est donc important de veiller à nourrir son animal avec une alimentation biologiquement adaptée à ses besoins et en quantités appropriées.

Toutefois, il semblerait que dans le terme grandir, les éleveurs consciencieux et soucieux de la bonne santé de la race, fassent bien la différence entre grandir et grossir et se réfèrent plutôt au fait d'évoluer et alertent sur les dangers du surpoids.

Démarrez comme pour n'importe quel chat en suivant le calculateur et pesez le après 3 semaines. Ici, en terme d'alimentation, nous considérons les chats comme adultes dès 12 mois.
Une petite perte de poids peut survenir, due au changement alimentaire, ne vous inquiétez pas. Toutefois, si la perte de poids se poursuit ou est trop importante, augmentez les quantités de 10 % et pesez votre chat à nouveau 3 semaines plus tard. Fiez vous à sa ligne également et à vos sensations

Plus d'infos

Caractérisation phénotypique de la dyskinésie paroxystique chez les Sphynx

Prévalence et caractéristiques des maladies oculaires chez les Sphynx

La vérité nue : mutations du KRT71 chez les Sphynx et les Devon Rex

Demographics of hip dysplasia in tne Maine Coon cat

Un laboratoire de l'université de Californie identifie une variante génétique cardiaque causant des problèmes aux chats Maine Coon

CMH-information aux eleveurs

Hairless animals